

# お子さんの予防接種のスケジュールをたててみましょう！

## 五種混合接種バージョン

- ★ 定期予防接種は、対象年齢や予防接種の間隔が定められています。かかりつけ医と相談し、計画的に受けましょう。
- ★ 予防接種の接種した日・予定の日を記入し、忘れないように注意しましょう。なお、予定した日に体調不良などで受けなかった場合は、かかりつけ医に相談してください。

予防接種の種類	対象年齢	1カ月	2カ月	3カ月	4カ月	5カ月	6カ月	7カ月	8カ月	9カ月	10カ月	11カ月	1歳	1歳2カ月	1歳4カ月	1歳6カ月	1歳9カ月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳		
定期接種	<b>ロタウイルス</b> (ロタリックス)	生後42日から 生後168日まで	↑①	↑②																														
	<b>ロタウイルス</b> (ロタテック)	生後42日から 生後224日まで	↑①	↑②	↑③																													
	<b>B型肝炎</b>	生後2か月から 1歳未満	↑①	↑②					↑③																									
	<b>小児用肺炎球菌</b> (プレバナー13・バクテリオン15)	生後2か月から 60か月に至るまで	↑①	↑②	↑③								↑④																					
	<b>五種混合</b> (ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・ヒブ)	生後2か月から 90か月に至るまで	↑①	↑②	↑③													↑④																
	<b>BCG</b> (結核)	生後1歳に至るまで					↑①																											
	<b>MR</b> (麻しん風しん混合)	①1歳以上2歳未満 ②小学校就学前年度												↑①																				
	<b>水痘ワクチン</b> (水ぼうそう)	生後1歳から											↑①					↑②																
	<b>日本脳炎</b>	①～③生後6～90カ月 ④9歳～13歳未満												↑①				↑②			↑①②	↑③					↑④							
	<b>二種混合</b> (ジフテリア・破傷風)	11～13歳未満																															↑①	
	<b>ヒトパピローマウイルス感染症予防</b> (子宮頸ガン予防)	小学6年から 高校1年相当の女子																																
	<b>ムンプスワクチン</b> (おたふくかぜ)	生後1歳から													↑①																			

ロタリックス・ロタテック どちらか一つを選択して接種することになります。  
選択したワクチンにより、接種回数・接種期間が異なります。

この接種例は、生後2か月以上7か月に至るまでの間に接種を開始した場合のものです。開始した月齢により、

年長時に三種混合＋不活化ポリオ予防接種を任意接種(自費)すると、より効果的です

小学校就学前年度(幼稚園、保育園の年長に相当)の期間内に接種

対象は、小学6年生から高校1年生相当の女子

小学校就学前年度(幼稚園、保育園の年長に相当)に2回目の接種がお勧めです

※ 上記は、当院でお勧めする標準的なスケジュールの例を示しています。接種の際は、かかりつけ医と相談しながら接種をすすめてください。  
 ※   : 定期予防接種の対象年齢   : 任意予防接種の対象年齢 ↑ : 予防接種を受けるお勧めの時期 丸付き数字(①、②など)は、接種回数です  
 ※ 乳児では筋肉量が少ない事から、当院では上腕三角筋部位ではなく上腕伸側下部位・大腿外側部位での接種をお勧めしています。

# 予防接種チェック表

## 五種混合接種バージョン

氏名 \_\_\_\_\_

生年月日 平成・令和 年 月 日

	ワクチン	種類	標準的接種年齢と接種間隔	第1回	第2回	第3回	第4回
定期 予防 接種	ロタウイルス (ロタリックス)	生	生後42日から生後168日まで ①-②の間は4週以上あけて計2回	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)		
	ロタウイルス (ロタテック)	生	生後42日から生後224日まで ①-②-③の間は4週以上あけて計3回	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	
	B型肝炎	不活化	生後2ヵ月から 1歳未満 ①-②の間は4週以上 ②-③の間は4-6ヵ月程度	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	
	小児用肺炎球菌 <sup>注1</sup> (プレベナー13・パクニユバンス15)	不活化	生後2ヵ月から ①-②-③の間はそれぞれ4週以上 ③-④の間は60日以上かつ1歳越えて	<input type="checkbox"/> (年 月 日)			
	五種混合 (ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・ヒブ)	不活化	生後2ヵ月から ①-②-③の間はそれぞれ3週以上 ③-④の間は6ヵ月以上(標準は1年)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)			
	BCG (結核)	生	～12ヵ月未満 標準的には5-8ヵ月に接種	<input type="checkbox"/> (年 月 日)			
	MR (麻疹・風疹)	生	①1歳以上2歳未満 ②小学校就学前年度(年長児)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)		
	水痘ワクチン (水ぼうそう)	生	1歳以上3歳未満 ①-②の間は3ヵ月以上(標準6～12ヵ月)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)		
	日本脳炎 <sup>注2</sup>	不活化	生後6ヵ月(標準は3歳)から ①-②の間は1週以上 ②-③の間は6ヵ月以上(標準およそ1年) ④9歳以上13歳未満	<input type="checkbox"/> (年 月 日)			
	二種混合 (ジフテリア・破傷風)	不活化	①11歳以上13歳未満	<input type="checkbox"/> (年 月 日)			
	ヒトパピローマウイルス感染症予防 (子宮頸がん予防)	不活化	小学6年生から高校1年生	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	
ムンプスワクチン <sup>注3</sup> (おたふくかぜ)	生	①1歳以上 ②は年長児での接種を推奨	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)			

注1 : 生後7ヵ月以降に接種を開始した場合は接種回数が異なります。詳細は、かかりつけ医に相談してください。

注2 : 日本脳炎の特例 (平成7年4月2日から平成19年4月1日に生まれた20歳未満の方は、7歳6ヵ月～9歳未満、13歳以上でも接種可能となっています)

注3 : MRワクチンと同様に1歳過ぎに1回目を接種します。その後2回目を接種することにより、さらに良好な予防効果を得られると考えられています。