

お子さんの予防接種のスケジュールをたててみましょう！

五種混合接種バージョン

★ 定期予防接種は、対象年齢や予防接種の間隔が定められています。かかりつけ医と相談し、計画的に受けましょう。

★ 予防接種の接種した日・予定の日を記入し、忘れないように注意しましょう。なお、予定した日に体調不良などで受けれなかった場合は、かかりつけ医に相談してください。

	予防接種の種類	対象年齢	1 カ 月	2 カ 月	3 カ 月	4 カ 月	5 カ 月	6 カ 月	7 カ 月	8 カ 月	9 カ 月	10 カ 月	11 カ 月	1 歳	1歳 2カ 月	1歳 4カ 月	1歳 6カ 月	1歳 9カ 月	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳
定期 予 防 接 種	ロタウイルス (ロタリックス)	生後42日から 生後168日まで		↑ ①	↑ ②																												
	ロタウイルス (ロタテック)	生後42日から 生後224日まで		↑ ①	↑ ②	↑ ③																											
	B型肝炎	生後2か月から 1歳未満		↑ ①	↑ ②															↑ ③													
	小児用肺炎球菌 (プレベナー13・パクニュパンス15)	生後2カ月から 60カ月に至るまで		↑ ①	↑ ②	↑ ③														↑ ④													
	五種混合	生後2カ月から 90カ月に至るまで		↑ ①	↑ ②	↑ ③															↑ ④												
	BCG (結核)	生後1歳に至るまで					↑ ①																										
	MR (麻しん風しん混合)	①1歳以上2歳未満 ②小学校就学前年度														↑ ①				↑ ②													
	水痘ワクチン (水ぼうそう)	生後1歳から														↑ ①			↑ ②														
	日本脳炎	①～③生後6～90カ月 ④9歳～13歳未満														↑ ①			↑ ②	↑ ③													
	二種混合 (ジフテリア・破傷風)	11～13歳未満																			↑ ①												
	ヒトパピローマウイルス感染症予防 (子宮頸ガン予防)	小学6年から 高校1年相当の女子																															
	ムンプスワクチン (おたふくかぜ)	生後1歳から														↑ ①				↑ ②													

※ 上記は、当院でお勧めする標準的なスケジュールの例を示しています。接種の際は、かかりつけ医と相談しながら接種をすすめてください。

※ :定期予防接種の対象年齢 :任意予防接種の対象年齢 ↑ :予防接種を受けるお勧めの時期 丸付き数字(①、②など)は、接種回数です

※ 乳児期は筋肉量が少ない事から、当院では上腕三角筋部位ではなく上腕伸側下部位・大腿外側部位での接種をお勧めしています。

予防接種チェック表 五種混合接種バージョン 氏名 _____ 生年月日 平成・令和 年 月 日

	ワクチン	種類	標準的接種年齢と接種間隔	第1回	第2回	第3回	第4回
定期予防接種	ロタウイルス (ロタリックス)	生	生後42日から生後168日まで ①-②の間は4週以上あけて計2回	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)		
	ロタウイルス (ロタテック)	生	生後42日から生後224日まで ①-②-③の間は4週以上あけて計3回	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	
	B型肝炎	不活化	生後2ヵ月から 1歳未満 ①-②の間は4週以上 ②-③の間は4-6ヵ月程度	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	
	小児用肺炎球菌 ^{注1} (プレベナー13・バクニュバンス15)	不活化	生後2ヵ月から ①-②-③の間はそれぞれ4週以上 ③-④の間は60日以上かつ1歳越えて	<input type="checkbox"/> (年 月 日)			
	五種混合 (ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・ヒブ)	不活化	生後2ヵ月から ①-②-③の間はそれぞれ3週以上 ③-④の間は6ヵ月以上(標準は1年)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)			
	BCG (結核)	生	~12ヵ月未満 標準的には5-8ヵ月に接種	<input type="checkbox"/> (年 月 日)			
	MR (麻疹・風疹)	生	①1歳以上2歳未満 ②小学校就学前年度(年長児)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)		
	水痘ワクチン (水ぼうそう)	生	1歳以上3歳未満 ①-②の間は3か月以上(標準6~12ヵ月)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)		
	日本脳炎 ^{注2}	不活化	生後6ヵ月(標準は3歳)から ①-②の間は1週以上 ②-③の間は6ヵ月以上(標準およそ1年) ④9歳以上13歳未満	<input type="checkbox"/> (年 月 日)			
	二種混合 (ジフテリア・破傷風)	不活化	①11歳以上13歳未満	<input type="checkbox"/> (年 月 日)			
	ヒトパピローマウイルス感染症予防 (子宮頸がん予防)	不活化	小学6年生から高校1年生	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	
	ムンプスワクチン ^{注3} (おたふくかぜ)	生	①1歳以上 ②は年長児での接種を推奨	<input type="checkbox"/> (年 月 日)	<input type="checkbox"/> (年 月 日)		

注1：生後7ヵ月以降に接種を開始した場合は接種回数が異なります。詳細は、かかりつけ医に相談してください。

注2：日本脳炎の特例（平成7年4月2日から平成19年4月1日に生まれた20歳未満の方は、7歳6ヵ月～9歳未満、13歳以上でも接種可能となっています）

注3：MRワクチンと同様に1歳過ぎに1回目を接種します。その後2回目を接種することにより、さらに良好な予防効果を得られると考えられています。